

氏名：

レジメン名：FOLFIRI (持続)+Ram

	Day1	Day8	Day14
注射	クロルフェニラミン注5mg+生食50mL 10分		
	ラムシルマブ8mg/kg+生食 初回1時間、2回目以降30分		
	デキサメタゾン注9.9mg+グラニセトロン注3mg 30分		
	レボホリナート注200mg/m <sup>2</sup> +ブドウ糖5%250mL 2時間 イリノテカンと同時に投与		
	イリノテカン注150mg/m <sup>2</sup> +ブドウ糖5%250mL 2時間 レボホリナートと同時に投与		
	5-FU注400mg/m <sup>2</sup> +生食50mL 全開投与		
	5-FU注2400mg/m <sup>2</sup> +生食 合計100mL 46時間 インフューザーポンプを使用		

【投与回数】

回目

【このレジメンの主な副作用】

インフュージョンリアクション(輸注症候群)

下痢

脱毛

悪心・嘔吐

高血圧

出血・塞栓症

骨髄抑制

口内炎

【副作用発現状況とグレード】

【投与量】

ラムシルマブ

レボホリナート

イリノテカン

5-FU

【その他】

東京都西東京市田無町4-24-15

医療法人社団時正会 佐々総合病院

電話 042-461-1535 (代)

薬剤科