

氏名：

レジメン名：mFOLFOX6+Trastuzumab

	Day1	Day8	Day15	Day22	Day29	Day36	Day42
	トラスツズマブ注 (初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg) + 生食250mL 初回90分 2回目以降30分			トラスツズマブ注 6mg/kg + 生食250mL 30分			
	デキサメタゾン注9.9mg+グラネセトン注3mg 30分		デキサメタゾン注9.9mg+グラネセトン注3mg 30分		デキサメタゾン注9.9mg+グラネセトン注3mg 30分		
注射	レボホリナート注200mg/m <sup>2</sup> +ブドウ糖5%250mL 2時間 オキサリプラチンと同時に投与		レボホリナート注200mg/m <sup>2</sup> +ブドウ糖5%250mL 2時間 オキサリプラチンと同時に投与		レボホリナート注200mg/m <sup>2</sup> +ブドウ糖5%250mL 2時間 オキサリプラチンと同時に投与		
	オキサリプラチン注85mg/m <sup>2</sup> +ブドウ糖5%250mL 2時間 レボホリナートと同時に投与		オキサリプラチン注85mg/m <sup>2</sup> +ブドウ糖5%250mL 2時間 レボホリナートと同時に投与		オキサリプラチン注85mg/m <sup>2</sup> +ブドウ糖5%250mL 2時間 レボホリナートと同時に投与		
	5-FU注400mg/m <sup>2</sup> +生食50mL 全開投与		5-FU注400mg/m <sup>2</sup> +生食50mL 全開投与		5-FU注400mg/m <sup>2</sup> +生食50mL 全開投与		
	5-FU注2400mg/m <sup>2</sup> +生食 合計100mL 46時間 インフューザーポンプを使用		5-FU注2400mg/m <sup>2</sup> +生食 合計100mL 46時間 インフューザーポンプを使用		5-FU注2400mg/m <sup>2</sup> +生食 合計100mL 46時間 インフューザーポンプを使用		
	生食100mL		生食100mL		生食100mL		

【投与回数】

回目

【このレジメンの主な副作用】

下痢  
しびれ・寒冷刺激  
悪心・嘔吐  
骨髄抑制  
血圧上昇・動悸

【副作用発現状況とグレード】

【投与量】 トラスツズマブ  
レボホリナート  
オキサリプラチン  
5-FU

【その他】  
HER2陽性の方が対象です

東京都西東京市田無町4-24-15  
医療法人社団時正会 佐々総合病院  
電話 042-461-1535 (内)  
薬剤科